Muerte resucitada

Sheila Segura Sánchez
Servicio Cardiología Pediátrica
Tutores: Ismael Martin de Lara
Ana Elena Fernández Bernal
Octubre 2015

Introducción

- **Presentación del caso**
- **Síndrome de Brugada**
 - Definición
 - Clínica
 - ECG
 - Diagnóstico
 - Tratamiento
- **Evolución del caso clínico**
- **Estudio familiar**
- **Peculiaridades del caso clínico**

Caso clínico

Niña de 11 meses

AP: Sin interés.

AF: Madre sana

Padre sano

Hermano de 8
años sano

Hermano de 3
años sano

- **Tras fiesta en el colegio**
 - Pérdida de conciencia
 - Desviación de la mirada hacia el lado derecho
 - Rigidez de miembros
 - Estridor inspiratorio
- **Acude a Hospital de San Juan →
Parada cardiorespiratoria**

Caso clínico

**RCP AVANZADA
ESTABILIZACIÓN
TRASLADO UCI PEDIÁTRICA**

Caso clínico

- Presenta **Fibrilación ventricular (FV)**, que precisa **Cardioversión eléctrica**
- Taquicardia con QRS estrecho → Ritmo sinusal (Amiodarona) 25mm/s
- ECG seriados: trastorno de la repolarización

Caso clínico

Síndrome de Brugada

- Enfermedad que se caracteriza por:
 - signos electrocardiográficos típicos en **precordiales derechas**
 - predispone a la muerte súbita (MS) secundaria a **taquicardia ventricular polimórfica (TVP)** y/o **fibrilación ventricular (FV)**
 - en ausencia de cardiopatía **estructural**.
- Canalopatías
- Descrita 1992:
 - Pedro y Josep Brugada
- 4-12% muerte súbita
- Prevalencia real?
 - 1-5/10.000 Europa y America
 - 12/10.000 Asia
- 8-10/1
- Mayor riesgo de muerte súbita

Síndrome de Brugada

- Enfermedad hereditaria:
 - AUTOSOMICA DOMINANTE
 - Penetrancia variable
- SCN5A (>75%) → subunidad alfa del canal de Na.
 - Identificada en el 15-30% afectos.
 - Otras mutaciones canales Ca y K

El desequilibrio de corrientes iónicas al final de la fase 1 produce una muesca característica. Este fenómeno ocurre de forma asimétrica en la pared ventricular y da lugar a un gradiente transmural de voltaje → Elevación típica ST y favorece las arritmias.

Síndrome de Brugada

Clínica:

Asintomáticos, síncope, palpitaciones

Se manifiesta de forma más frecuente en la edad adulta

41+-15

Síntomas: en reposo, sueño, episodios febriles y condiciones de predominio vagal

ECG:
V1-2-3

Tipo 1
"Coved"

ST $\geq$ 2 mm
T negativa

Tipo 2 & 3
"Saddle back"

ST $\geq$ 2 mm
T positiva
Silla de montar

Cualquiera
anteriores
ST $\leq$ 1mm

Síndrome de Brugada

Diagnóstico:

- Cuando lo sospechamos pero no aparece en ECG:
 - Test farmacológico con drogas → Bloquean el canal de Na
 - ✦ **Ajmalina**, Flecainida, Procainamida
 - **Diagnóstico** (Consenso de expertos 2005):
 - ✦ **Patrón de ECG tipo 1** (espontáneo o tras test)
 - ✦ **≥ 1 :**
 - Muerte súbita recuperada
 - TVP documentada
 - Historia clínica de síncope no vasovagal
 - Antecedentes familiares de muerte súbita en $<$ de 45 años sin síndrome coronario
 - Estudio Electrofisiológico

Síndrome de Brugada

Pronóstico y estratificación del riesgo

Variables que predicen peor pronóstico pero la estratificación es controvertida:

- **MS recuperada**
- **Síncope y ECG tipo 1**
- Varón
- Inductibilidad de arritmias en estudio electrofisiológico
- Muerte súbita familiar

Pronóstico. Estratificación de riesgo.

Sintomáticos :

- ✦ Muerte súbita
- ✦ Síncope

Tipo I espontáneo.

3. Controvertidos :

- ✦ Inducibilidad EEF
- ✦ MS familiar

Síndrome de Brugada

Pronóstico y estratificación del riesgo

Variables que predicen peor pronóstico pero la estratificación es controvertida:

- **MS recuperada**
- **Síncope y ECG tipo 1**
- Varón
- Inductibilidad de arritmias en estudio electrofisiológico
- Muerte súbita familiar

Tratamiento

- **Medidas generales:**
 - Control de la fiebre
 - Fármacos : www.brugadadrugs.org
 - Evitar ingesta excesiva alcohol
- **DAI: único tratamiento que disminuye la MS**
 - Clase I:
 - ✦ Pacientes que han sobrevivido a muerte súbita
 - ✦ TV sostenida espontánea con o sin síncope
- **Fármacos**
 - Inhibidores corrientes K: QUINIDINA
 - Aumentan corrientes Ca: ISOPROTERENOL
- **Ablación con catéter**

Caso clínico

Evolución

Hemodinámica	Neurológico	Respiratorio
<ul style="list-style-type: none">• No nuevas arritmias tras quinidina• Tratamiento agresivo de la fiebre• Se evitan fármacos relacionados	<ul style="list-style-type: none">• Exploración neurológica alterada•RMN: Hallazgos compatibles con encefalopatía hipóxico-isquémica que afecta a sustancia blanca y ganglios de la base.•EEG: Crisis electro-clínicas con focalidad dominante hemisférica izquierda con generalización secundaria.• Potenciales evocados: tiempos de conducción en las vías acústicas tronculares conservados, pronóstico favorable.	<ul style="list-style-type: none">• Conectada a Ventilación mecánica invasiva•Fracaso extubación•Traqueostomía (al mes del episodio)

Caso clínico

HOSPITAL MATERNOINFANTIL
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Estudio electrofisiológico:
Tratamiento médico vs desfibrilador automático implantable (DAI)

Caso clínico

- **Cateterismo cardiaco:**
 - 1º estudio electrofisiológico con quinidina sin incidencias.
 - 3º día ingreso: taquicardia ventricular
 - ✦ 2º estudio electrofisiológico: gran alteración del sistema de conducción → episodios de taquiarritmias
 - **Ablación de la rama derecha del Haz de His**
- Se reinicia Quinidina

Caso clínico

- Mejoría neurológica
- Retirada cánula de traqueostomía
- Nutrición oral + enteral nocturna
- No nuevos episodios de Taquicardia ventricular.
 - Quinidina 32 mg/kg/día

Caso clínico

PELAEZ PARDO, VEGA
15-08-10-141802

HOSPITAL GENERAL ALICANTE

10/08/2015
14:25:29

PHILIPS

CARD.PED.
S8-3
MI 1,3
TIS 0,5

F3 Gan. 82
232dB/C3
B / 3 / 3

66Hz 9cm

G
P ▲ R
3,0 8,0

Caso clínico

- Pasa a pediatría
- Situación actual:
 - Seguimiento por Neurología. Tratamiento anticomercial
 - Tratamiento rehabilitador
 - Seguimiento por Gastroenterología Pediátrica
 - Seguimiento por Cardiología Pediátrica
 - Seguimiento por UHDP
- Ingresada 15/09/15 para administración de vacunas:
 - Vacuna antineumocócica 13-valente
 - Triple vírica

Estudio familiar

	Padre	Abuela paterna	Madre	Hermano 8 años	Hermano 3 años
Estudio genético	+	+	-	-	+
Test de ajmalina	+	No realizado	No realizado	No realizado	+
Estudio electrofisiológico	+	No realizado	No realizado	No realizado	- No síntomas
Tratamiento	DAI				No

Síndrome Brugada

Peculiaridades del caso clínico

- Características de la paciente:
 - Lactante
 - Mujer
 - Riesgo de padecer frecuentes procesos febriles
- Controversia del tratamiento
 - Tamaño del DAI
 - Recambios, rotura, infecciones
 - Descargas del DAI
- Estudio familiar