Utilidad de los corticoides sistémicos en el tratamiento de la neumonía grave

Sara Montero Murdvee
R3 Pediatría HGUA
Sección Neumo-Alergia Infantil
Tutor: Luis Moral
Fecha: 03/11/2015

Antecedentes

- Respuesta inflamatoria local y sistémica mediada por citoquinas
 - Ayuda a eliminar patógenos
 - Puede dañar:
 - Exacerbando una disfunción pulmonar al disminuir el intercambio de gas alveolar
 - La inflamación sistémica grave contribuye a la sepsis
- La terapia con corticoides sistémicos adyuvantes, podría atenuar la respuesta inflamatoria y consecuentemente:
 - Disminuir la frecuencia de distrés respiratorio
 - Disminuir la duración de la enfermedad y hospitalización
 - Disminuir la mortalidad

¿Está demostrada la utilidad de los corticoides sistémicos en el tratamiento de la neumonía grave del adulto?

2 ensayos clínicos

- En pacientes tratados con corticoides ($p < 0,05$)
 - Menor incidencia de shock
 - Menos necesidad de ventilación mecánica
 - Menor tiempo medio hasta estabilidad clínica
- No diferencias en mortalidad: $p > 0,05$

Estudios observacionales + revisiones

- Pacientes que recibieron corticoides: enfermedad respiratoria crónica asociada, presentación clínica grave.
- En los casos graves mejoran la hipoxemia, la necesidad de ventilación mecánica y el tiempo de cuidados intensivos.
- Mayor tiempo de ingreso en el grupo tratado con corticoides ($p < 0.01$) → Tener en cuenta las características iniciales de los pacientes (clínica más grave y comorbilidad).

¿Se han descrito problemas secundarios o efectos adversos por el uso de corticoides?

- Aumento de frecuencia de **hiperglucemia** que precisa tratamiento.
- **NO** aumento en la frecuencia de hemorragia intestinal, complicaciones neuropsiquiátricas ni necesidad de reingreso.

¿Qué régimen de dosificación y duración de tratamiento se ha empleado?

- **Metilprednisolona 0.5mg/kg cada 12 horas durante 5 días**
- **Prednisona 50mg/día durante 7 días**
- **No especificado**

Corticosteroid Therapy for Patients Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia

A Systematic Review and Meta-analysis

Reed A.C. Siemieniuk, MD; Maureen O. Meade, MD; Pablo Alonso-Coello, MD, PhD; Matthias Briel, MD, MSc; Nathan Evaniew, MD; Manya Prasad, MBBS; Paul E. Alexander, MSc, PhD; Yutong Fei, MD, PhD; Per O. Vandvik, MD, PhD; Mark Loeb, MD, MSc and Gordon H. Guyatt, MD, MSc

- 13 estudios controlados aleatorizados
- Dexametasona, prednisolona, prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona vs placebo
- Reducción **mortalidad** (todas las causas) 3% (IC 0,45-1,01)
 - Análisis subgrupos: disminuye la mortalidad en los grupos con neumonía grave (IC 0,2-0,77)
- Reducción necesidad **ventilación mecánica** 5% (IC 0,26-0,79)
 - Neumonía grave RR 0,54 (IC ,.5-0,58)
 - Neumonía menos grave RR 0,18 (IC 0,08-0,43)
- Reducción de tiempo de ingreso 1 día (IC 1,79 a -0,21)

¿Hay estudios en población pediátrica?

Neumonía refractaria por *Mycoplasma pneumoniae*

- 4 estudios:
 - desaparición de la fiebre en <48 h en el grupo tratado con corticoides
 - resolución radiográfica más rápida en el grupo tratado con corticoides

Efficacy of Methylprednisolone in Children With Severe Community Acquired Pneumonia

Bela Nagy, MD, PhD,^{1*} Imre Gaspar, MD,¹ Agnes Papp, MD,¹ Zsolt Bene, MD,¹
Bela Nagy Jr, MD, PhD,² Zoltan Voko, MD, PhD,³ and Gyorgy Balla, MD, PhD¹

- Estudio aleatorizado, abierto, no ciego
- Imipenem + Metilprednisolona 20 mg 5 días vs Imipenem + placebo
- Resultados:
 - Día 7: En el grupo tratado con corticoides la fiebre duró un 50% menos ($p=0,006$), el recuento de leucocitos fue menor ($p=0,023$) y los niveles de PCR eran menores (20,5 mg/L vs 35,1 mg/L)
 - Objetivos secundarios:
 - Duración de ingreso mayor en el grupo placebo ($p=0,006$)
 - Mayor número de complicaciones ($p=0,026$) en el grupo placebo (derrame pleural, empiema y absceso)

Adjunct Corticosteroids in Children Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia

Anna K. Weiss, Matthew Hall, Grace E. Lee, Matthew P. Kronman, Seth Sheffler-Collins and Samir S. Shah

Pediatrics 2011;127:e255; originally published online January 10, 2011;
DOI: 10.1542/peds.2010-0983

- Estudio de cohortes, multicéntrico.
- Resultados:
 - La terapia con corticoides se asoció a menor tiempo de ingreso en los pacientes que recibían tratamiento concomitante con b-agonistas
 - Entre los pacientes que no recibían b-agonistas, los corticoides se asociaron con mayor tiempo de ingreso y mayor número de reingresos

Conclusiones

- El uso de corticoides como tratamiento adyuvante en la neumonía grave es eficaz en adultos
- Además ha demostrado ser seguro en adultos
- En niños existen pocos estudios
- En los estudios existentes en niños parece que puede haber efecto beneficioso con tratamiento corticoideo en la neumonía grave/complicada