Neonato con hipercalcemia

Ana Lorenzo Amat

R3 Pediatría HGUA

Tutoras: Verónica Escario y Lorea Ruiz

12 de noviembre 2015

Indice

- Caso clínico
- Hipercalcemia neonatal
 - Generalidades
 - Definición
 - Manifestaciones clínicas
 - Etiología
 - Diagnóstico
 - Tratamiento
- Hipercalcemia hipocalciurica familiar
- Conclusiones

Caso clínico

Neonato de 7 días de vida ingresa para estudio de hipercalcemia asintomática y anemia

- **Antecedentes personales:**

- RNT (39s+6). AEG (4000g). Talla: 55cm (p>97). PC: 37cm(p90-97)
- Parto instrumentado (vakum). Precisó PPI. Apgar 4/9
- EGB positivo, profilaxis completa. Controles clínicos normales
- Riesgo ictericia hemolítica (eluido anti A positivo, Coombs directo positivo), sin precisar fototerapia
- Hipercalcemia asintomática al alta (calcio total 11,4mg/dl, calcio iónico 1,62 mmol/L)

Caso clínico

- **Antecedentes familiares:**

- Madre, 37 años. Nacida en Rumania. G6A2V3. Sana
- Padre, 41 años. Sano
- Hermano 16 años, sano. Vive en España
- Hermano de 7 años, sano. Vive en Rumania
- Hermano fallecido al año de vida por sepsis

Caso clínico

- **Evolución:** Revisión a los 7 días de vida:
 - Lactancia materna exclusiva
 - No había recibido vitamina D
 - Adecuada ganancia ponderal
 - Exploración física: Ictericia generalizada. Soplo protosistólico vibratorio grado I//VI en BEI. Resto normal
 - Gasometría capilar: **Ca iónico 1,72mmol/L, Hb 10,9g/dl.**
Bili 12,3mg/dl

**INGRESO PARA ESTUDIO DE
HIPERCALCEMIA NEONATAL**

Hipercalcemia neonatal

Generalidades

- Calcio plasmático: 3 fracciones

- Funciones intracelulares (transmisión de señales, reacciones enzimáticas) y extracelulares (coagulación, secreción endocrina, conducción nerviosa, contractilidad muscular)

Generalidades

- Regulación calcemia: PTH, Vitamina D y calcitonina
- Receptor sensible al calcio (**CaSR**): “calciostato” límites entre 7,5mg/dl-11,5mg/dl

Generalidades

Definición

- Calcemia normal en recién nacido: **7,6-10,5 mg/dl** (2,1-2,6 mmol/L)
- Calcio iónico: 4,4-5,2 mg/dl (**1,1-1,3 mmol/L**)

Hipercalcemia: calcio plasmático > **10,5-11mg/dl**
calcio iónico > **1,4 mmol/L**

- Hipercalcemia leve < 12mg/dl
- Hipercalcemia moderada 12-14 mg/dl
- Hipercalcemia grave > 15mg/dl

Manifestaciones clínicas

DIGESTIVAS	RENALES	NEURO-MUSCULARES	CARDIO-VASCULARES
Estreñimiento Anorexia Náuseas Vómitos Dolor epigástrico Ileo paralítico Pancreatitis	Poliuria Nicturia Polidipsia Nefrocalcinosis Nefrolitiasis Insuficiencia renal	Astenia Hipotonía Irritabilidad Mialgias, artralgias Fracturas patológicas	Hipertensión arterial Palpitaciones ECG: onda T ancha, QT corto

Etiología

- **Causas maternas:**
 - Hipercalcemia materna por hipervitaminosis A o D, tiacidas, tirotoxicosis, hiperparatiroidismo
 - Hipoparatiroidismo
- **Causas alimentarias:** causa más frecuente
 - Exceso de suplementos de calcio
 - Hipofosfatemia (NPT mal formulada, prematuros)
- **Trastornos relacionados con vitamina D:**
 - Ingesta materna excesiva de vitamina D
 - Necrosis grasa subcutánea
- **Disfunción paratiroidea:**
 - Hiperplasia paratiroidea congénita
 - Condrodisplasia metafisaria de Jansen

Etiología

- **Defecto del receptor sensor del calcio:**
 - Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
 - Hiperparatirodismo neonatal severo
- **Mecanismos fisiopatogénicos inciertos:**
 - Hipercalcemia infantil idiopática. Síndrome de Williams
 - Hipofosfatasa infantil severa
 - Síndrome de los pañales azules
 - Hipotiroidismo congénito
 - ECMO
 - Nefroma mesoblástico congénito

Diagnóstico

- **Anamnesis.** Descartar causas maternas
- **Exploración física:** lesiones rojo-azuladas induradas (necrosis grasa subcutánea); bajo peso, cara de elfo, soplo cardiaco (síndrome Williams)
- **Pruebas de laboratorio:**
 - Calcio sérico, calcio iónico
 - Fosforo, magnesio, fosfatasa alcalina
 - PTH
 - Vitamina D
 - Hormonas tiroideas
 - Excreción urinaria de calcio, fósforo, relación calcio-creatinina
- **Pruebas de imagen**

Diagnóstico

Tratamiento

- Niveles de calcemia, sintomatología, causa subyacente
- **Primer escalón:**
 - Hiperhidratación con suero salino isotónico 0,9%
 - Furosemida 1-4mg/kg/día
- **Segundo escalón:**
 - Calcitonina 4-8 UI/kg/día cada 6-12 horas, subcutánea o intramuscular
 - Metilprednisolona iv 2mg/kg/día
- **Tercer escalón:**
 - Bifosfonatos: pamidronato (dosis única iv de 0,5 a 1mg/kg en infusión continua) o etidronato (7,5mg/kg/día)
- **Cuarto escalón:** hemodiálisis o diálisis peritoneal

Caso clínico

- **Pruebas complementarias:**
 - **Estudio de sangre periférica: Hb 12,7 mg/dl.** Hematocrito: 39,1%. Reticulocitos: 0,8%. No signos morfológicos de hemólisis
 - **Ecografía cerebral y abdominal: normales**
 - **Bioquímica: Calcio total: 11,8mg/dl.** Fosfato: 5,3mg/dl. Bili total: 12,26mg/dl. Bili directa: 0,57mg/dl. FA: 137U/l. Mg: 2,04mg/dl
 - **PTH: 25pg/ml (normal).** 25(OH)VitD: 8,1ng/ml (2ª determinación 14ng/ml). **1,25(OH)VitD: 29,2pg/ml (normal).** TSH: 4,56mU/L. T4: 1,6ng/dl

Caso clínico

- **Pruebas complementarias:**

- **ECG:** ritmo inusual a 140lpm. PR: 0,11seg. QRS +100°. QTc: 0,392seg. **Microvoltaje de ondas T**

- **Ecocardiograma:** Foramen oval permeable pequeño (2-3mm)

- **Analíticas de control:** Calcio total 12,3-13,7mg/dl. Calcio iónico 1,5-1,7mmol/L

- **Bioquímica de orina:** índice Ca/Cr < 0,01

HIPERCALCEMIA ASINTOMÁTICA

+

HIPOCALCIURIA

Diagnóstico

Hipercalcemia Hipocalciúrica familiar (HFF)

HHF

- Hipercalcemia benigna familiar
- Causa poco frecuente de hipercalcemia
- Autosómica dominante, alta penetrancia
- Mutación inactivante de un único alelo del receptor sensible al calcio (CaSR), brazo largo del cromosoma 3
- Mutación de 2 alelos → **Hiperparatiroidismo neonatal grave** (hipercalcemia severa, hipotonía, retraso crecimiento, desmineralización ósea)

HHF

- **Diagnóstico:**

- Hipercalcemia leve-moderada
- Hipermagnesemia leve
- Excreción de calcio en orina descendida (<5mg/kg/día) o cociente aclaramiento de calcio/aclaramiento de creatinina **menor de 0,01**

$$\text{Cao/Cro: Ca urinario} \times \text{Cr plasmática} / \text{Ca plasmático} \times \text{Cr urinaria}$$

- PTH discretamente elevada (20%) o normal
- Estudio mutacional del gen CaSR

HHF

- **Diagnóstico diferencial** con hiperparatiroidismo primario:
 - Presencia de sintomatología, osteopenia, osteitis fibroso quística
 - Estudio familiar
 - Estudio de excreción calcio en orina: cociente $\text{Ca/Cr} > 0,02$ en hiperparatiroidismo primario
 - Puede precisar paratiroidectomía

Caso clínico

- **Evolución:**

- Alta a los 16 días de vida, asintomático, cifras de calcio estables

- Seguimiento en consultas externas de Endocrinología Infantil:
calcio total: 12,3mg/dl, fosfato: 5mg/dl, PTH normal
25(OH)Vitamina D: 50,5 ng/ml.

- Estudio calcemia en familiares de primer grado

Madre: calcio 11,6 mg/dl; Fosfato 3 mg/dl; PTH y Vitamina D normales

Padre: calcio, fosfato, PTH y vitamina D normales

Hermano, pendiente de estudio

Caso clínico

- **Evolución:**

- **Estudio genético del gen CASR: POSITIVO** (variante patogénica en heterocigosis: c.496A>G; p.(Ser166Gly) en el gen CASR.

- Asintomático, sin precisar tratamiento

Conclusiones

- Hipercalcemia neonatal es poco frecuente
- Hallazgo incidental vs causa de graves secuelas
- Causa más frecuente es iatrogénica
- Hipercalcemia hipocalciurica familiar: hipercalcemia moderada asintomática + hipocalciuria + niveles de PTH normales o ligeramente elevados
- Estudio familiar ante sospecha de HHF y solicitar estudio genético del CaSR