STEVENS JOHNSON

Josep León Mengíbar

Tutora: Olga Gómez Pérez (Sección de Pediatría)

Servicio de Pediatría, HGUA

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN

Niña de 10 años con fiebre de 4 días junto a exantema y mucositis. Ha tomado Paracetamol e Ibuprofeno

- Exantema: Lesiones eritemato-papulares en cara tronco, pubis, MMII y MMSS, lesiones ampollosas en tronco y dorso manos
- Faringe: Mucosa oral inflamada, eritematosa con lesiones aftosas/ulcerativas generalizadas en toda cavidad oral y labios
- Genitales: Eritema en zona vulvar
- Ojos: Hiperemia conjuntival intensa. No exudados

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

- AS: Hemograma, Bioquímica y coagulación normal PCR:18.20mg/dl
- Test de Tzanck: Negativo
- Serología (CMV, VEB, Mycoplasma, Parvovirus, Toxoplasma): negativos
- Biopsia:

Epidermis con vacuolización de la capa basal, presencia de queratinocitos necróticos e infiltrado inflamatorio por linfocitos.

Ampolla subepidérmica: queratinocitos necróticos, infiltrado inflamatorio por linfocitos y vasos sanguíneos dilatados y congestivos.

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

- Inmunoglobulinas IV (1gr/kg/día durante 3 días)
- Metamizol IV
- Fluidoterapia
- Antibiótico tópico

Sospecha etiología farmacológica:
Ibuprofeno
Paracetamol

EVOLUCIÓN

Metamizol IV +
Fluidoterapia

ALTA

0

2

10

Rápida progresión
exantema y
afectación
mucosas

Mejoría significativa estado general,
cesa la progresión de las lesiones con
mejoría mucositis y conjuntivitis

Stevens Johnson

Inicio Inmunoglobulinas

Mejoría reactantes fase
aguda

DEFINICIÓN:

Incidencia: 1'2-2casos/millón/año

- Enfermedad inflamatoria aguda, originada por una hipersensibilidad, que incluye la piel y mucosas
- Puede ser inducida por muchos factores precipitantes, desde medicamentos, infecciones o sd. paraneoplásicos
- Comienzo repentino, con fiebre y cefalea simulando un cuadro gripal con posterior empeoramiento general
- Se caracteriza por una erupción morfológicamente variable, acompañada de estomatitis y manifestaciones oculares

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EXANTEMAS:

Vesículo/ampoloso:

Infecciones:

- Herpes simple
- Varicela-Zóster
- Mano-pie-boca

Etiología diversa:

- Steven-Johnson
- NET
- Sde de Sweet
- Eritrodermia
- Dermatitis bullosa Ig A
- Pénfigos paraneoplásicos
- Erupción fototóxica
- Sde de la piel escaldada estafilocócica

Purpúrico/Petequial:

Infecciones:

- Meningococemia
- Enterovirus
- Sde papulopurpúrico en guante y calcetín
- Dengue hemorrágico
- Ricketsiosis
- Endocarditis

Etiología diversa:

- Vasculitis: Schönlein-Henoch, edema agudo hemorrágico del lactante
- Hemopatías: Coagulopatías, trombocitopenias

CLASIFICACIÓN:

- Stevens Johnson: afectación <10% extensión cutánea
- NET: Afectación >30% extensión cutánea
- SJS/NET: Afectación entre el 10-30%

- Causas Stevens Johnson:

Infeciosa

- Virales
 - VIH
 - Adenovirus
 - Coxsackie
 - Epstein-Barr
 - Hepatitis A, B y C
 - Herpes simple 1 y 2
 - Herpes zoster
 - Influenza tipo A
 - Varicela
 - Sarampión
- Protozoarios
 - *Plasmodium*
 - *Trichomona*
- Bacterianas
 - Estreptococos
 - Micobacterias
 - *Mycoplasma*
 - Salmonela
- Micóticas
 - Coccidioidomicosis
 - Dermatofitos
 - Histoplasmosis

Farmacológica

FRECUENTE

Alopurinol
Barbitúricos
Carbamacepina
AINES
Penicilina
Fenitoína
Sulfonamidas

OCASIONAL

Cefalosporinas
Clindamicina
Codeína
Etambutol
Furosemide
Sales de oro
Minoxidil
Estrógenos y progesterona
Fenotiazidas
Rifampicina
Tetraciclinas
Tolbutamida
Vancomicina
Verapamilo

Asz S, García L, Rojas P et al. Eritema multiforme. DermatologíaCMQ2006;4(4):268-277

TRATAMIENTO:

1r: Retirada del agente causal

2n: Sintomático:

- Monitorización: Función respiratoria, hemodinámica, nivel de consciencia...
- Reposición de líquidos
- Nutrición (parenteral/enteral)
- Control T^a y analgesia
- HPBPM
- Cuidados de la piel
- Cuidados ojos y mucosas

3r: Orientado a frenar evolución (controvertido):

- Inmunoglobulinas
- Corticoides
- Inmunosupresores: Ciclosporina, Ciclofosfamida
- Plasmaferesis
- Agentes anticitocinas: Anti TNF

BIBLIOGRAFÍA:

- Doval G, Claude R, Cruces P. Necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson: clasificación y actualidad terapéutica. *Actas Dermosifiliogr* 2000;91:541-551.
- Clavijo R, Davila I, García J. Síndrome de Stevens – Johnson: una forma grave de las reacciones adversas a medicamentos. *Biomedicina*, 2011,6(3)26-34.
- Asz S, García L, Rojas P et al. Eritema multiforme. *DermatologíaCMQ*2006;4(4):268-277.
- Sekula P, Dunant A, Mockenhaupt M et al. Comprehensive survival analysis of a cohort of patients with Steven-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis. *JInvestDermatol*2013;133:1197.
- Garin S, Rzany B, Stern RS et al. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Steven-Johnson syndrome, and erythema multiforme. *Arch Dermatol* 1993;129:92.