Lactante de 11 meses con episodio de anemia aguda

Raquel Revert Gil – R1 Pediatría
Cristina Moscardó – Hematología Pediátrica
M.Carmen Vicent/Amelia Herrero-Ud. Lactantes
Hospital General Universitario de Alicante

Caso clínico

Motivo de consulta:

Lactante 11 meses que acude por **fiebre** de 4 horas

Decaimiento. Asintomática

Antecedentes:

Familiares: sin interés. No consanguinidad

Periodo perinatal normal

Dos episodios de sibilancias en relación con cuadros catarrales

Caso clínico

Exploración física:

T: 38.6 ° FC 177 lpm

Regular estado general. Tinte ictérico

Neurológicamente estable

AC con soplo sistólico II/VI paraesternal

Hepatomegalia 1-2 traveses de dedo

Ante este cuadro clínico:

Ante sospecha de **sepsis**: expansión con SSF e inicio de cefotaxima empírica
Extracción de hemograma y bioquímica en hospital de origen (Medimar)

Caso clínico

Análisis de sangre:

Hb 5mg/dL (Coombs +)

Leucocitos 14.000 (69.2% N; 21.4% L; 9.4% M)

Plaquetas 326.000

PCR no cuantificable 0,5

Bilirrubina total 4,6 mg/dL

GPT 111 U/L

GOT 121 U/L

SITUACIÓN CLÍNICA

❖ Anemia de instauración rápida

Hb 4 g/dL.

Decaimiento

Taquicardia y soplo paraesternal

❖ Sospecha de Hemólisis

Bilirrubina y transaminasas elevadas

Hepatomegalia

Coombs positivo

Anemia hemolítica autoinmune Revisión

Anemia hemolítica

Reducción de la vida media de los hematíes por destrucción eritrocitaria anormalmente alta (hemólisis)

La M. O. intenta compensar ↑ **la producción eritroide** (mediada por EPO)

Porcentaje de **reticulocitos** en sangre periférica (>2%)

Índices reticulocitarios

Bilirrubina no conjugada (por incremento del catabolismo)

Haptoglobina. Rápidamente depurada por el SMF sobrepasando la capacidad hepática de síntesis

Clasificación A. HEMOLÍTICA

	CRÓNICA	AGUDA
Tipo de hemólisis	Extravascular	Intravascular
Clínica	Según intensidad.	Palidez, subictericia, taquicardia, hipotensión, coluria (si intensa).
Orina	Aumento urobilinógeno	Aumento hemosiderina y hemoglobina
Ejemplos	Esferocitosis, talasemia, defectos enzimáticos, drepanocitosis, etc.	A. Hemolítica autoinmune, anemia hemolítica microangiopática, malaria.

Algoritmo Diagnóstico

Anemia no hemorrágica
Aumento de reticulocitos en sangre
Aumento LDH y Bilirrubina Conjugada
Disminución Haptoglobina

Hemólisis

Test de Coombs

negativo

positivo

FROTIS SP
ESFEROCITOSIS
MALARIA

ESTUDIO
ENZIMÁTICO
DÉFICIT G6F

ELECTROFORESIS
HEMOGLOBINA
TALASEMIA

ANEMIA
HEMOLÍTICA
AUTOINMUNE

Tipos de anemia hemolítica autoinmune (AHAI)

ANTICUERPOS FRÍOS	ANTICUERPOS CALIENTES	HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA
<ul style="list-style-type: none">• Ig M• Rara en niños• A temperatura < 37º• <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, VEB	<ul style="list-style-type: none">• Ig G• Mayoritariamente niños (60-90%)• A temperatura 37º• Infección viral• <u>Intravascular: esplenomegalia</u>	<ul style="list-style-type: none">• Ig G• Exclusivamente en niños• A temperatura < 37º• Infección viral

Clasificación AHAI

Primaria (idiopática)

Sin evidencia de enfermedad sistémica

40-50% de los casos pediátricos (por **Ac calientes**)

Secundaria (asociada a otra enfermedad)

Autoanticuerpos calientes EXCEPTO post-infecciosas (aglutininas frías)

Más del 50% considerar siempre que haya AHAI.

- **Enf. Autoinmunes** (lupus, Sjögren, CU, tiroiditis, DM)
- **Inmunodeficiencias** (primarias y secundarias)
- **Sd. Evans**
- **Procesos malignos** (hematológicos)
- **Trasplante** (sólido y de precursores hematopoyéticos)
- **Fármacos** (piperacilina el más frecuente)
- **Postinfecciosas** (clostridiales, neumocócicas)

Volviendo a nuestro caso clínico

PRUEBAS COMPLEMENTARIA

COAGULACIÓN
Normal

Bioquímica

Bilirrubina total **3,31 mg/dL**
B directa 0,74 mg/dL
B indirecta 2.57 mg/dL
GOT 94 U/L
GPT 102 U/L

Hemograma

Hb 4 mg/dL
Eritrocitos 1.38×10^6
Hto 15,4%
VCM 111,60 fL
HCM 29 pg
CHCM 26 g/dL
Ancho de distribución eritrocitaria 22.4%
Eritroblastos 5,2%

COOMBS +++++

PRUEBAS COMPLEMENTARIA

SANGRE PERIFÉRICA

Serie roja: eritroblastos ocasionales. No esquistocitos. Anisocitosis

Serie Blanca: ausencia de blastos. Plaquetas normales

Datos morfológicos compatibles con AIHA

Interconsulta Hematología

A1. Escrutinio de anticuerpos irregulares positivo con panaglutinación y autoanticuerpos positivos. Coombs directo positivo 4+, IgG+ y C3d+

Compatible con Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos

PRUEBAS COMPLEMENTARIA

Serología: negativa

Brucella, CMV, ac heterófilos Epstein Barr, Coxiella burnetti, Mycoplasma, Parvovirus B19, Toxoplasma gondii y Leishmania

Rx Tórax (imagen)

Engrosamiento peribronquial perihiliar bilateral de predominio izquierdo sin claras imágenes de atelectasia o consolidación

Hemocultivo

Streptococcus hominis (probable contaminante)

Revisión: TRATAMIENTO

Tratamiento: indicaciones de transfusión

No hay consenso: depende del grado de anemia y su instauración

Indicaciones transfusión

Si anemia leve – moderada: indicación relativa. (La reticulocitosis puede compensar)

En caso de **anemia grave** (Hb inferior a 5 g/dL) **URGENTE** (65% lo requieren)

Globulos rojos alogénicos. Favorable incluso aunque se produzca hemólisis

Realizar pruebas cruzadas y transfundir en primer lugar O negativo

Tratamiento según tipo de AHAI

<u>Paroxística</u>	<u>Por ac. fríos</u>
<ul style="list-style-type: none">- Evitar exposición al frío- Transfusión si anemia grave	<ul style="list-style-type: none">- Evitar exposición al frío- Tratamiento antibiótico de la causa (<i>Mycoplasma</i>)- Grave sintomática: trasfusión y rituximab

TRATAMIENTO AIHA por anticuerpos calientes

Trasfusión en el momento agudo

Corticoides: efecto rápido (24-48h) y buena respuesta (50-80%)

- **GRAVE** (Hb <6GDK) **metilprednisolona** iv (0,5-1 mg/kg) cada 6-8h durante 24 a 72 horas. Tras ella se inicia **prednisona** vía oral
- **MODERADA** (Hb 7-8): prednisona vo a 2mg/kg

- **Prednisona vo:** de 2 a 4 meses en dosis única diaria. Mantener hasta normalización de parámetros
- Control Hb, LDH, reticulocitos, DAT. Mantener terapia hasta normalización

La suspensión brusca de CORTICOIDES causa recaídas

Recaídas

Deben tener un **seguimiento** aproximado de **un año**

15-40%

DAT puede permanecer débilmente positivo

En caso de persistencia de positividad investigar otras enfermedades autoinmunes

En caso de recaída: corticoides a mínima dosis eficaz

Terapias de segunda línea		
Rituximab	Esplenectomía	Inmunosupresores
Plasmaféresis	Inmunoglobulinas IV	Trasplante células hematopoyéticas

...CURSO EVOLUTIVO

Hospitalización

Se realizaron **2 transfusiones**

Metilprednisolona

Dosis de **carga** 4 mg/kg

Dosis de **mantenimiento** 2 mg/kg

Cefotaxima iv y azitromicina 5 días hasta resultado HC por sospecha AC fríos

Seguimiento en Consultas externas:

Buena evolución

Buena respuesta a disminución progresiva corticoides

Sin embargo...

- El pasado día 25/09 acude de nuevo a UPED
 - Se extrae analítica completa y se adelanta revisión en Hematología Pediátrica

RECAÍDA

Resultado esperable tras retirada de corticoides

Conclusiones

AIHA: hemólisis provocada por autoanticuerpos

- Se produce anemia cuando se excede la capacidad de síntesis

- **Caliente / fría** (reactividad térmica)
- **Primaria / secundaria** (enfermedad subyacente)

Tratamiento óptimo: depende de la gravedad y cronicidad y de los autoanticuerpos

- **Anemia grave y súbita:** trasfusión urgente
- **Paroxística:** proceso autolimitado. Evitar frío
- **Agglutininas frías** (*Mycoplasma pneumoniae* o VEB): no suele necesitar tratamiento
- **Caliente:** Corticoides. Curso crónico y posibles recaídas
- **Si no hay respuesta:** terapias de segunda línea

Muchas gracias por vuestra
atención