SÍNDROME DE COCKAYNE

A PROPÓSITO DE UN CASO

Paula Soler López
HGUA

CASO CLÍNICO

- RNT (37sg) PEG tipo III. Peso 1990 gr (<p3), longitud 45.5 cm (<p3), y perímetro craneal 31.5 cm (<p3)
- AF: Hermano del padre con síndrome dismórfico, microcefalia y retraso mental (fallecido a los 33 años). Madre con quemaduras I° grado de repetición
- EF: microcefalia, hipotonía

Fiebre
38.5°

Analítica y bioquímica

Cultivo LCR

Virus LCR

ECO cerebral

ECO abdominal

TORCH ampliada

CMV orina

Urocultivo

Hemocultivo

Normales

E. Coli

GENÉTICA

- **CARIOTIPO:** sin alteraciones
- **ARRAY:** delección 11p13 de 250 .04 kb (significado incierto)
 - Array madre: normal
 - Array padre: delección 11p13
- **EXOMA:** heterocigosis en las variantes c.2203C>T (p.Arg735Ter) y c.1431_1432delGA (p.Lys478Thrfs*9) en el gen ERCC6.

Exoma madre:
Portadora en heterocigosis
c.2203C>T;p.(Arg735Ter).

Exoma padre:
Portador en heterocigosis
c.1431_1432delGA;
p.(Lys478Thrfs*9)

Sd. cerebrooculofacioesquelético

Sd. Cockayne tipo B

Sd. De Sanctis-Cacchione

Sd. Sensibilidad a UV

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

PEAT	Hipoacusia neurosensorial grave bilateral
PEV y ERG	Normales
PESS	Respuestas somestésicas del nervio mediano, con afectación de la conducción central por encima de la unión bulbomedular, de predominio para el nervio mediano derecho
RM CEREBRAL	Retraso en el patrón de mielinización cerebral de las vías corticoespinales y de la corteza rolándica y prerrolándica sin calcificaciones

SÍNDROME DE COCKAYNE

Herencia AR

Signos cardinales:
microcefalia y fallo de
medro

Incidencia 1/250.000

Prevalencia 1/2.5
millones

Grupo: enfermedades
con defecto en la
reparación del ADN
por escisión de
nucleótidos (NER)

Componente
mitocondrial

SÍNDROME DE COCKAYNE

ERCC 6
Cr 5
(CS-B)

ERCC 8
Cr 10q11
(CS-A)

- Tipo I: "clásico o moderado". Dx en primera infancia
Supervivencia entorno a los 20 años
- Tipo II: "grave". Rara supervivencia en la infancia
- Tipo III: "leve". Supervivencia hasta la edad adulta

SÍNDROME DE COCKAYNE. CLÍNICA

Fenotipo facial

- Ojos hundidos
- Nariz prominente
- Pérdida de grasa subcutánea periorbitaria

Rasgos cardinales

- Microcefalia
 - Fallo de medro
- 100% pacientes

Audición y visión

- Cataratas (aparición precoz > muerte temprana)
- Fotofobia
- Distrofia retiniana
- Pérdida progresiva de audición

SÍNDROME DE COCKAYNE. CLÍNICA

Musculoesquelético

- Contracturas
- Escoliosis
- Debilidad
- Afectación más frecuente a MMII

Gastrointestinal y hepáticas

- Difícil tolerancia oral
- RGE
- Disfunción hepática (colestasis)

SÍNDROME DE COCKAYNE. CLÍNICA.

Cardiovascular y respiratorio

- Extremidades frías
- Arteroesclerosis avanzada
- Dificultad venopunción
- Cardiopatía dilatada
- Hipertensión
- Infecciones respiratorias recurrentes

Dermatológicas

- Fotosensibilidad (sin incrementar riesgo de tumores dermatológicos)

SÍNDROME DE COCKAYNE. CLÍNICA.

SÍNDROME DE COCKAYNE. CLÍNICA

Farmacología

-METRONIDAZOL: ¡Contraindicado!

Fallo hepático con incremento extremo de transaminasas

-Respuesta exagerada a opioides y sedantes

MANEJO SD. COCKAYNE

Recommended active follow-up/surveillance

Diagnosis	First-line molecular testing of <i>CSA</i> and <i>CSB</i> Molecular testing of <i>ERCC5</i> if <i>COFS</i> phenotype and <i>CSA/CSB</i> are normal
Named clinical input (should be easily accessible)	Coordinating clinician (pediatrics, genetics if adult) Dietician (before supplementary feeding required) Physiotherapist/occupational therapist
Annual surveillance	Cataracts (annual/biannual until 4 years old) Retinal evaluation (lifelong) Hearing assessment Review by named clinician, including: Blood pressure, serum U&Es if symptomatic Liver function tests Blood glucose (from 10 years old) Review by physiotherapy
Management for:	Consider:
Hypertension	Amlodipine ± ACE inhibitor
GERD	Proton pump inhibitor ± prokinetic agent
Tremor	Co-careldopa
Recurrent pneumonia	Referral for swallow assessment
Low temperature/unexplained symptoms	Thyroid function tests
If unclear whether weight loss is due to inadequate intake or pathological subcutaneous fat loss	Titrate NG/PEG feeds against weight gain, avoiding rapid increases in volume
AVOID (may be fatal)	Metronidazole (and related antibiotics)
Exercise extra vigilance	Opioids (consider starting at 1/3 dose) Sedatives
Routine investigations that are commonplace but not indicated without clinical symptoms	
CT/MRI of brain	Typical findings are not pathognomonic, prognostic, or clinically actionable
Echocardiography	Reported abnormal in only one asymptomatic individual (dilatation ascending aorta)
Renal ultrasound	Renal calculi only actionable finding to date

ACE, angiotensin-converting enzyme; *COFS*, cerebro-oculofacioskeletal; CT, computed tomography; GERD, gastroesophageal reflux disease; MRI, magnetic resonance imaging; NG, nasogastric; PEG, percutaneous gastrostomy; U&E, urea and electrolytes.

CONCLUSIONES SD. COCKAYNE.

1. El síndrome de Cockayne es una enfermedad heredo degenerativa rara, multisistémica y de mal pronóstico que requiere de una visión multidisciplinar y en la cual hay que tener una alta sospecha clínica
2. A pesar de pertenecer a las enfermedades relacionadas con alteraciones de la reparación DNA, no presenta mayor riesgo de cáncer
3. Es fundamental contrastar la genética con la clínica en todos los casos
4. El factor pronóstico más importante es la presencia de cataratas por debajo de los 3 años
5. El grado de fotosensibilidad no se relaciona con el pronóstico
6. Hay que evitar la administración de metronidazol o derivados por el riesgo de producir un fallo hepático agudo

BIBLIOGRAFIA

1. Wilson, B., Stark, Z., Sutton, R. *et al.* The Cockayne Syndrome Natural History (CoSyNH) study: clinical findings in 102 individuals and recommendations for care. *Genet Med* **18**, 483–493 (2016).
2. Cockayne EA. Dwarfism with retinal atrophy and deafness. *Arch Dis Child* 1936;**11**:1–8.
3. Venema J, Mullenders LH, Natarajan AT, van Zeeland AA, Mayne LV. The genetic defect in Cockayne syndrome is associated with a defect in repair of UV-induced DNA damage in transcriptionally active DNA. *Proc Natl Acad Sci USA* 1990;**87**:4707–4711.
4. Nance MA, Berry SA. Cockayne syndrome: review of 140 cases. *Am J Med Genet* 1992;**42**:68–84.
5. Síndrome de Cockayne. *Orphanet*. 2009; https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=191&lng=ES
6. María de la Luz Arenas Sordo, Edgar Hernández Zamora, Luis Alberto Montoya Pérez, Beatriz Catalina Aldape Barrios. Cockaynes Syndrome: A case report. Literature review. *Scielo. Med. oral patol. oral cir.bucal* vol.11 no.3 may./jun. 2006

SD COCKAYNE.A PROPÓSITO DE UN CASO.

¡Gracias!

XXXVI Congreso
Sociedad Valenciana
de Pediatría (SVP)
22 al 24 de abril de 2021

www.socvalped.com