BUSCANDO RESPUESTAS

Casos clínicos SEPHO

Observa lo mismo que todos, pero piensa en todo lo demás

Dra. Marta Simó Nebot. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Dr. Pedro J Alcalá Minagorre. Hospital General Universitario Alicante

Instrucciones votación interactiva

Para votar deben entrar desde su Smartphone a la siguiente dirección web: 2poll.net/AEP2019

O acceder desde la **APP Congreso AEP 2019** al apartado de **VOTACIÓN INTERACTIVA**

Espera a que comience la votación:

Elija su respuesta y pulse "VOTE"

BUSCANDO RESPUESTAS

Casos clínicos SEPHO

Observa lo mismo que todos, pero piensa en todo lo demás

Dra. Marta Simó Nebot. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Dr. Pedro J Alcalá Minagorre. Hospital General Universitario Alicante

Casos clínicos SEPHO

Una alternativa diagnóstica olvidada en el dolor abdominal

Dr. Pedro J Alcalá Minagorre

Hospital General Universitario de Alicante

Casos clínicos SEPHO

Una alternativa diagnóstica olvidada en el dolor abdominal

Relativas a esta presentación no existen potenciales conflictos de interés

Presentación del caso

- Varón de 13 años con consultas reiteradas por dolor abdominal

- Síntomas:
 - Predominio en fosa iliaca derecha
 - Sin cambios en el hábito intestinal, ni relación con ingesta
 - Afebril, sin pérdida de peso ni anorexia
- Numerosas ausencias escolares

Historia y exploración física

- Antecedentes personales:
 - Vértigo e inestabilidad sin correlación orgánica
 - Trastorno ansiedad en seguimiento por Unidad Salud Mental
 - Esteatosis hepática secundaria a obesidad
- Antecedentes familiares:
 - Padre:
 - Obesidad, tabaquismo
 - Trastorno depresivo e hipocondría
 - Madre: antecedente de cirugía bariátrica
- Exploración física:
 - Obesidad generalizada IMC > p99, 3,14 DE
 - Dolor palpación en punto doloroso de fosa iliaca derecha
 - Ausencia de signos de afectación peritoneal

Dolor abdominal crónico

- Criterios :
 - Temporales: ≥ 3 episodios, durante > 3 meses
 - Repercusión actividades cotidianas
- Prevalencia: 10-14% (edad escolar)
- Etiología:
 - Potencial manifestación de enfermedad grave
 - > 100 enfermedades médico/quirúrgicas
 - Especial atención en menores de 3 años
 - Cuando no se identifica causa $\rightarrow$ naturaleza funcional
- Evaluación basada en:
 - Anamnesis detallada y exploración física rigurosa

Diagnosis Mapped to Location

Right Upper Quadrant	Right Lower Quadrant
Hepatitis Cholecystitis Cholelithiasis Biliary colic Cholangitis Right lower lobe pneumonia Kidney disease Urinary tract disease	Constipation Mesenteric adenitis Crohn disease Acute obstruction Localized perforation Appendicitis Intussusception Ovarian torsion Ectopic pregnancy Testicular torsion Hernia
"All Over"	"All Over"
Gastroenteritis Perforation Constipation Functional disease Colic Streptococcal pharyngitis Intussusception Inflammatory bowel disease Henoch-Schönlein purpura Diabetic ketoacidosis	Porphyria Sickle cell crisis Volvulus Abdominal migraine Cyclic vomiting syndrome Lead poisoning Iron ingestion Familial Mediterranean fever Angioneurotic edema Venous thrombosis

¿Cuál no es un signo de alarma en un dolor abdominal crónico?

1. Dolor alejado de región periumbilical, en especial hemiabdomen derecho
2. Dolor o diarrea que despierta al paciente
3. Úlceras orales recurrentes o afectación perianal
4. Dolor cólico intermitente en mayor de 5 años

Datos alarma

- ✓ Pérdida peso involuntaria/fallo de medro
- ✓ Signos de sangrado intestinal
- ✓ Vómitos biliosos o hemáticos
- ✓ Diarrea con productos patológicos
- ✓ Diarrea o dolor que interrumpen sueño
- ✓ Fiebre acompañante
- ✓ Ictericia
- ✓ Síntomas urinarios
- ✓ Localizado en hemiabdomen derecho
- ✓ Úlceras orales recurrentes
- ✓ Enfermedad perianal
- ✓ Hallazgos patológicos exploración
- ✓ Signos de afectación articular
- ✓ Hª familiar de inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca o úlcera gástrica

Pruebas complementarias dirigidas y/o derivación especialistas médicos/quirúrgicos

Dolor abdominal funcional

- *Si tras la evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden ser explicados por otra causa*
- Prevalencia: 5-10% (5-12 años)
- Criterios Roma IV (2016)
- Teorías fisiopatológicas
 - Base somatomórfica
 - Trastorno interacción cerebro intestinal
 - Predisposición familiar y genética

Table 1. Functional Gastrointestinal Disorders: Children and Adolescents

H1. Functional nausea and vomiting disorders
H1a. Cyclic vomiting syndrome
H1b. Functional nausea and functional vomiting
H1c. Rumination syndrome
H1d. Aerophagia
H2. Functional abdominal pain disorders
H2a. Functional dyspepsia
H2b. Irritable bowel syndrome
H2c. Abdominal migraine
H2d. Functional abdominal pain—not otherwise specified
H3. Functional defecation disorders
H3a. Functional constipation
H3b. Nonretentive fecal incontinence

Dolor abdominal funcional

El dolor abdominal funcional puede preceder, coexistir o suceder a otras enfermedades orgánicas

Sobre el dolor abdominal funcional ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

1. Se trata de un diagnóstico de exclusión basado en la anamnesis, exploración y seguimiento
2. No es recomendable realizar pruebas complementarias de forma sistemática
3. El objetivo principal es la desaparición absoluta y precoz del dolor, y así lograr la recuperación de la normalidad
4. La aceptación de los componentes biopsicosociales del dolor por familiares/paciente es un indicador favorable

Manejo del dolor abdominal funcional

- **El objetivo principal no radica en:**
 - La desaparición precoz y absoluta del dolor
 - Ni evidenciar falta de organicidad con sucesivas pruebas *“su hijo no tiene nada”*
- **Clave: recuperación de la actividad habitual normal del paciente**
 - Aceptación de los componentes biopsicosociales del dolor por parte de los implicados
 - Tendencia a la cronicidad → se requiere identificación precoz y abordaje interdisciplinar
 - Múltiples estrategias:
 - Intervenciones en el ámbito psicológico
 - Modificaciones dietéticas, probióticos, medicación

“No es recomendable realizar pruebas complementarias de forma sistemática”

Consejos vendo, pero para mí no tengo....

¿Causa orgánica subyacente?

Síntomas médicamente inexplicables

Trastornos somatomorfos

Síntomas sugerentes de una enfermedad médica, pero sin hallazgos orgánicos o mecanismos fisiológicos que la demuestren

Sistemas clasificación enfermedades

¿En nuestro caso?

Clínica del paciente

- Dolor abdominal recurrente
- Sin repercusión aparente en su estado general
- Sin signos de alarma
- Pruebas reiteradamente normales

Actitud del paciente

- Conformidad durante los ingresos
- Mejor control síntomas en el hospital
- Interferencia con actividad diaria
- Ingresos en épocas clave del curso
- Mal rendimiento escolar
- Pobreza relaciones sociales

Actitud de los padres

- Preocupación extrema del padre
- Obsesión por los síntomas
- Constantes preguntas sobre la presencia del dolor
- Solicitud de pruebas cada vez más invasivas
- Madre en “segundo plano”

Sobre el manejo de trastornos somatomorfos, ¿cuál es falsa?

1. La producción de los síntomas es ficticia y busca producir beneficios secundarios
2. Con frecuencia se detectan conflictos de origen psicológico como sustrato del cuadro
3. No se ha de profundizar en la realización de pruebas complementarias innecesarias con la finalidad de satisfacer al niño o a su familia, ni ofrecer tratamientos injustificados
4. La terapia cognitivo conductual puede mejorar los síntomas, apoyándose en una relación de confianza con el pediatra, manteniendo el seguimiento evolutivo

Abordaje de trastornos somatomorfos

Escuchar, explicar en qué consiste, es algo real y no simulado *“no le pasa nada”*

Orientar el diagnóstico evitando exceso pruebas y procedimientos invasivos

Sensibilizar sobre los aspectos emocionales que pueden favorecer o mantener el proceso

Remitir a salud mental para abordaje conjunto

Seguimiento evolutivo: no deben sentirse médicamente abandonados

Intervenciones

Marco relacional con la familia

- Inicialmente colaboradores con intervención psicoconductual
- Pero cada vez mayor preocupación
- Discrepancias con el manejo →
- Gran tensión emocional
- Trasciende que el padre está a punto de poner en venta su negocio para buscar atención privada

Solicitan laparoscopia exploradora y estudio endoscópico

¿Cuál sería la decisión más adecuada desde el punto de vista ético?

1. Respetar la decisión del padre, las consecuencias no nos incumben, aunque resulte una actuación médica no justificada. Por un principio de autonomía, pueden tomar cualquier decisión al respecto de la salud de su hijo
2. Ante el conflicto, es oportuno la valoración por otro compañero, que empiece de cero la relación y el estudio del caso
3. Acceder a la realización de las pruebas en nuestro centro, para reestablecer la confianza, y además no podemos dar la certeza absoluta de que “no tiene nada”
4. Tras la aplicación de un análisis del caso, establecer un marco de acuerdo terapéutico con el paciente y la familia, fundamentando nuestras decisiones en los principios de beneficencia y no maleficencia

En esta situación conflicto...
¿qué puede aportar la Bioética?

Método deliberativo *(Feito y Gracia 2011)*

1. Presentación de los participantes
2. Análisis de los “hechos”
 - Presentación del caso
 - Análisis de los aspectos clínicos

Método deliberativo (Feito y Gracia 2011)

3. Identificación de los problemas éticos
 - Elección del problema ético principal
 - Identificación de los valores en conflicto
 - Identificación de los cursos extremos de acción
 - Árbol de cursos intermedios de acción
4. Análisis de los “deberes”

Método deliberativo (Feito y Gracia 2011)

5. Elección del curso óptimo de acción
6. Pruebas de consistencia del curso elegido
 - Legalidad ¿es legal la opción elegida?
 - Publicidad ¿estarías dispuesto a defenderla públicamente?
 - Tiempo ¿tomarías esta misma decisión si pudieras esperar?
7. Decisión final

En nuestro caso

→ Análisis de los hechos

“Dolor que no impresiona de enfermedad grave,
interferencia grave en la vida paciente/familia, conflicto en su manejo”

→ Identificación de los problemas y valores en conflicto

Incertidumbre diagnóstica/temor angustia familiar/consumo de recursos de la
comunidad/frustración/juicio paterno potencialmente / yatrogenia

→ Cursos extremos de acción

- Rechazar solicitud → ruptura relación médica

vs

- Transigir realización → yatrogenia secundaria

En nuestro caso

→ Evaluar a nivel de principios éticos de cada acción

Autonomía

Justicia

No maleficencia

Beneficiencia

→ Curso óptimo de acción

→ Decisión final: tratar de aproximarse a lo más justo, correcto, prudente
Reestablecer alianza terapéutica

Principios implicados

No maleficencia

- Obliga a no hacer daño, tratar con consideración y respeto

Beneficencia

- Obliga a hacer el bien, procurar el mayor beneficio posible y limitando al máximo los riesgos o perjuicios

¿Justicia? Fenómeno de etiquetado

Historia personal
trastornos psicológicos
psiquiátricos

Asumir
indebidamente

Síntomas
secundarios a
patología psiquiátrica
psicológica y no a
otra enfermedad

Sesgos cognitivos

**Anclaje del
diagnóstico inicial**

Sin revisarlo a la
luz de nuevos
datos

Síntomas médicamente inexplicables

“Cuando un dedo señala al cielo, sólo el necio mira al dedo” Amelie Poulain

Bases fisiopatológicas del dolor abdominal

Dolor Visceral

Distensión, tracción o isquemia de víscera hueca
Nociceptores C-delta nervios espláncnicos, desmielinizados
Conducción lenta
Mala delimitación
Puede ser referido
Sordo, urente, cólico, puede asociar síntomas vegetativos

Dolor Parietal

Piel, tejido subcutáneo, aponeurosis, grupos musculares, y peritoneo parietal
Nociceptores A-deltamielinizados
Conducción rápida
Bien localizado en zona afectada
Se agrava con la presión y palpación
Hiperalgnesia

Dolor de pared abdominal

- Olvidada en abordaje dolor abdominal crónico
- Prevalencia
 - Población adulta → 20% prevalencia
 - Pediatría: probablemente infradiagnosticada (≈ 13%)
- Riesgo diagnóstico de simulación/t. somatomorfos
- Dolor crónico → síntomas esfera emocional

Dolor de pared abdominal

Causa > frecuente → atrapamiento nervioso cutáneo abdominal anterior

Angulaciones nervios sensitivos (T6-L1) al atravesar el anillo fibroso del músculo recto

- Cualquier ↑ presión intra o extraabdominal puede producir atrapamiento
 - Ejercicio
 - Obesidad
 - Compresión mecánica
- Zona cercana línea semilunar
- Predominio en hemiabdomen derecho
- Otras causas
 - Hernias de la pared abdominal
 - Lesiones nerviosas durante la cirugía abdominal
 - Síndrome miosfacial abdominal → puntos gatillo
 - Compresión por estructuras de la pared torácica (apéndice xifoides/costilla flotante)
 - Neuralgia herpética

¿Cuál no es sugestivo de dolor originado en la pared abdominal?

1. Dolor localizado a punta de dedo ≤ 2 cm
2. Localización constante de la zona dolorosa
3. Hipersensibilidad superficial y alodinia
4. El dolor empeora con la ingesta

Dolor de pared abdominal

- Características del dolor:
 - Localizado a punta de dedo ✓
 - Independiente de ingesta y hábito intestinal ✓
 - Empeora con ropa apretada/ ejercicio físico/estornudos/ ✓
 - Más frecuente en obesidad ✓

✓ Signos presentes en nuestro paciente

¿Cuál es la prueba con mayor rendimiento
ante sospecha de dolor de pared
abdominal?

1. Maniobra de Carnett
2. Resonancia magnética nuclear
3. Ecografía del plano muscular
4. Electromiografía

Maniobra de Carnett

- Paciente en decúbito supino
 - Presión con el dedo sobre el área dolorosa
 - Contracción de la musculatura abdominal
- Signo positivo: ↑ síntomas → dolor pared abdominal
- Aceptable sensibilidad y especificidad
- Alta relación costo-efectividad
- Interpretación cautelosa ante:
 - Edades tempranas
 - Dolor abdominal agudo
 - Pacientes con signos de reacción peritoneal

✓ Signo positivo en nuestro paciente

Tratamiento dolor pared abdominal

Elección → infiltración de los puntos dolorosos
con anestésicos locales ± corticoides

- Respuesta inmediata
- Infiltración ecoguiada mejora la eficacia y seguridad
- Mejoría mantenida > t_{1/2} del fármaco
- En adultos efecto > placebo
- Si evolución desfavorable
 - Neurolísis química
 - Neurectomía quirúrgica
- En todos los casos, mantener enfoque biopsicosocial y apoyo psicológico

Resumen curso clínico

Conclusiones I

- El pediatra:
 - Debe aproximarse con cautela ante lo inexplicable
 - No asumir etiología sin un correcto diagnóstico de exclusión
 - Es el responsable de descartar lo grave y urgente
- El dolor abdominal originado en pared abdominal
 - Entidad olvidada en la valoración del dolor abdominal crónico
 - Diagnóstico sustentado en Hª clínica y exploración física dirigida
 - Infiltración anestésica: terapia de elección/confirmación dx

Conclusiones II

- Enfermedad → Dimensiones psicológicas y físicas
- A evitar → Etiquetado y anclaje diagnóstico
- Bioética → Recurso para decisiones prudentes en condiciones de incertidumbre

Gracias por la atención

Entonces... ¿quieres ser un
pediatra hospitalario?

Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria

SEPHO

Febrero de 2019

www.sepho.es