I JORNADA CIENTÍFICA

CONOCER LA DISCAPACIDAD

"IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO TEMPRANO
EN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y EN LOS
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO"

Información e
inscripciones:

conocerladiscapacidad.com

29

Miriam González Santacruz, Eva María García Cantó
Unidad de Neonatología.
Hospital General Universitario de Alicante

■ *Evaluación de nuestro trabajo en la consulta de seguimiento*

- ✧ *Antecedentes del tema. Justificación*
- ✧ *Objetivos. Propósito*
- ✧ *Material y Métodos*
- ✧ *Resultados y discusión*
- ✧ *Conclusiones*

Eva María García Cantó, Miriam González Santacruz
Unidad de Neonatología.
Hospital General Universitario de Alicante

Antecedentes del tema. Justificación

- Aumento de la prematuridad :**7-10%**
- Los RNPT <1500g (<32s) : **1-3%**

- Nuestra Unidad: **60-70** casos/año (25-30 <1000g o <28s)

- Supervivencia: RNPT >28sem (>1000g): **>90%**
RNPT <28sem (<1000g) : **50-80 %**
(*incluye RNPT **23-25 sem** y 450-700g*)

- Mayor riesgo de alteraciones en su desarrollo :**patología física y neuropsicológica** comportamiento, aprendizaje, rendimiento

- La supervivencia sin secuelas importantes

✓ >28 sem >1000g > **70%**

✓ <28sem <1000g > **50%**

✓ <26 (23-26sem) > **30%**

Seguimiento, prevención y actuación precoz

Objetivos de un Programa de Seguimiento

- Constitución de grupos de trabajo
- Recogida sistemática de información
- Creación Bases de datos. Análisis y difusión de resultados
- Implementación de medidas preventivas desde el periodo neonatal

METAS DE LAS INTERVENCIONES

SUPERVIVENCIA SIN SECUELAS

ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO

REDES DE VIGILANCIA

SEN-1500

EPISEN-study

Sociedad Española
de Neonatología

EPICURE

Estudio multicentrico
Reino Unido e Irlanda
RN <26sg

EPIPAGE

RN < 33 sg
Francia

VON

Vermont
Oxford Network
1200 hospitales
de todo el mundo

NICHD

El Instituto
Nacional de la
Salud Infantil y
Desarrollo
Humano EEUU

Evolución Física, Neurosensorial y Psicológica (Cognitiva y Conductual) hasta los 6 años de los Recién Nacidos de Peso Inferior a 1500 gramos al nacimiento

Servicio de Neonatología y Psicología

HGUA

El propósito de este estudio

- ✓ Reconocer las secuelas
- ✓ Obtener datos que nos ayuden a la prevención de las mismas ya desde el periodo neonatal
- ✓ Intervenir de forma precoz y multidisciplinaria
- ✓ Ayudar a la familia y al niño en el proceso de adaptación a la escuela y la sociedad

Todas las experiencias vividas

**VAN HA INFLUIR EN EL
DESARROLLO DEL CEREBRO**

Existe evidencia acerca de como las interacciones tempranas moldean la arquitectura cerebral

Todos los cuidados realizados

PERIODO PRENATAL

UCIN

CONSULTA DE SEGUIMIENTO

**CUIDADOS CENTRADOS EN
EL DESARROLLO Y EN LA FAMILIA**

Los objetivos de este estudio

1

- Evaluar el **desarrollo físico** (crecimiento, morbilidades orgánicas en diferentes sistemas), **neurosensorial** (visión y audición) **y psicológico** (cognitivo y conductual-adaptativo) de los RNPT<1500g
- Analizar la **aparición y grado de secuelas**

2

- Estudio de los **recursos educativos** extra aplicados
- **Rendimiento escolar**

3

- Analizar la relación entre variables relevantes de morbilidad perinatal y la aparición de:
 - ✓ Desarrollo cognitivo deficiente (CI <85)
 - ✓ Rendimiento escolar bajo
 - ✓ Problemas adaptativos (TDAH y TEA)

Material y Métodos

Estudio observacional **45** RNMBP <1500 g, nacidos en el año 2008 y controlados en la consulta de neonatología y de psicología infantil del HGUA durante los primeros 6-7 años de vida (alta en el año 2015)

- ✓ Elevada dispersión geográfica del área de salud atendida por la Unidad de Neonatología del HGUA (toda la provincial)
- ✓ Dificultades en la adherencia de los pacientes

Material y Métodos

Secuelas a los 2 años

LEVE

Parálisis Cerebral Infantil
(PCI) leve
Hipoacusia < 40 db
Alteraciones (A) Visuales
corregidas lentes
CI: 71-84

MODERADA

PCI moderada
Hipoacusia = 41-90 db
A. Visuales no corregidas o
ceguera unilateral
CI: 55-70

GRAVE

PCI grave
Hipoacusia bilateral con
amplificación
Ceguera bilateral
CI < 55

Comorbilidades

Sistema Respiratorio, Sistema Endocrino,
Sistema Digestivo, Sistema Dermatológico

Resultados (1)

Tabla 1. Características demográficas de la muestra estudiada n=245 (%)

Sexo	
Varones (%)	21 (47)
Mujeres (%)	24 (53)
Edad gestacional (semanas)	
Media $\pm$ SD	29,8 $\pm$ 0,36
< 28 semanas	7 (16)
Peso al nacimiento (g)	
Media $\pm$ SD	1202 $\pm$ 37
< 1000g	9 (20)
Pequeño para edad gestacional (%)	10 (22)
Tipo de gestación	
Simple (%)	30 (65)
Múltiple (%)	15 (35)
Procedencia	
Propio hospital (%)	43 (95,5)
Otros hospitales (%)	2 (4,5)
Corticoides prenatales	38 (84)

?

Resultados

Tabla 2. Morbilidad durante el periodo neonatal n = 45 (%)	
Enfermedad de membrana hialina (%)	<u>31 (69)</u>
Grado I-II	28 (62)
Grado III-IV	3 (7)
Surfactante	<u>23 (51)</u>
DAP hemodinámicamente significativo (%)	<u>16 (36)</u>
Tratamiento médico	12 (27)
Tratamiento quirúrgico	4 (9)
Hemorragia cerebral (HIPV)^a (%)	<u>3 (6)</u>
Grado II-III	3 (6)
Leucomalacia periventricular quística	<u>1 (2,2)</u>
Sepsis precoz (%)	1 (2,2)
Sepsis tardía (%)	<u>9 (20)</u>
Enterocolitis necrotizante (%)	<u>1 (2,2)</u>
Tratamiento médico	0
Tratamiento quirúrgico	1 (2,2)
Displasia Broncopulmonar (%)	<u>6 (13)</u>
Sin tratamiento	5 (11)
Con tratamiento médico	1 (2)
ROP^b (%)	<u>1 (2,2)</u>
^a Hemorragia intra-periventricular	
^b Retinopatía del prematuro	

Resultados

Distribución de la morbilidad neonatal en los grupos de riesgo :
<1000gr, <28semanas y Pequeños para la edad Gestacional (PEG)

Los casos de EMH, PDA, Sepsis y DBP fueron en su mayoría <28 semanas
Los casos Hemorragia cerebral fueron en su mayoría <1000g

Resultados

CRECIMIENTO: EVOLUCION PESO A LOS 2 y 6 AÑOS

2 AÑOS

- Peso adecuado
- Peso bajo

6 AÑOS

- Peso adecuado
- Peso bajo
- Sobrepeso

Años (n=45)	Peso adecuado n (%)	Peso bajo n (%)	Sobrepeso n (%)
2 años	34 (76)	11 (24)	
4 años	41 (91)	4 (9)	
6 años	36 (80)	4 (9)	5 (11)

Tabla: Evolución del peso n= casos (porcentaje. Curvas de la de OMS

Resultados

CRECIMIENTO: EVOLUCIÓN DE TALLA A LOS 6 AÑOS

2 AÑOS

■ Talla adecuada ■ Talla baja

6 AÑOS

■ Talla baja ■ Talla adecuada

Años (n=45)	Talla adecuada n (%)	Talla baja n (%)
2 años	42 (93,3)	3 (6,6)
4 años	43 (95,5)	2 (4,5)
6 años	44 (97,8)	1 (2,2)

Tabla: Evolución de talla expresado como n= casos (porcentaje).
Curvas de la OMS.

Resultados

CRECIMIENTO: EVOLUCIÓN PERÍMETRO CEFÁLICO A LOS 2 AÑOS

■ PC adecuado ■ PC bajo

Años (n=45)	P. Cefálico adecuado n (%)	P. Cefálico bajo n (%)
2 años	37 (83)	7 (17)

Tabla: Evolución perímetro cefálico expresado como n= casos (porcentaje).
Curvas de la OMS.

Resultados

CRECIMIENTO: PESO MEDIO EN MUJERES Y VARONES DE 2-7 AÑOS

Figura 3. Evolución del peso medio en mujeres prematuras desde los 2 hasta los 7 años de edad.

Figura 2. Evolución del peso medio en varones prematuros desde los 2 a los 7 años de edad.

Resultados

CRECIMIENTO: TALLA MEDIA EN MUJERES Y VARONES 2-7 AÑOS

Figura 5. Evolución de la talla media en mujeres prematuras desde los 2 a los 7 años de edad.

Figura 4. Evolución de la talla media en varones prematuros desde los 2 a los 7 años de edad.

Resultados

Tabla 3. Secuelas sobre diferentes sistemas orgánicos de la población en seguimiento en función del tiempo n (%)

RESPIRATORIO

Asma	4 (8,8)
Asma leve	
2 años	1 (2,2)
4 años	1 (2,2)
6 años	1 (2,2)
Asma moderada-grave	
2 años	3 (6,7)
4 años	3 (6,7)
6 años	3 (6,7)

ENDOCRINO

Talla baja sin tratamiento

2 años	3 (6,7)
4 años	2 (4,4)
6 años	1 (2,2)

Tratamiento con GH^a

2 años	0
4 años	0
6 años	0

Obesidad

2 años	0
4 años	0
6 años	0

Patología tiroidea

2 años	1 (2,2)
4 años	0
6 años	0

Resultados

COCIENTE DE DESARROLLO -TEST BRUNET-LEZINE 28 MESES

Tabla 4. Cociente de desarrollo a los 28 meses de edad

	Total n = 39 (%)	Postural n = 39 (%)	Social n = 39 (%)	Lenguaje n = 39 (%)	Coordinación oculo-motora n = 39 (%)
	Nº de casos (%)				
<70	1 (2,5)	0	0	2 (5,13)	1 (2,63)
71-84	4 (10,2)	2 (5,13)	5 (12,82)	2 (5,13)	2 (5,1)
85-120	34 (87,1)	37 (94,87)	34 (87,18)	35 (89,74)	36 (94,74)
>120	0	0	0	0	0
Media ± SD	94,65±1,54	95,9 ± 1,54	95,9 ± 1,80	95,9 ± 1,80	95,10 ± 1,70

A los 28 meses edad corregida (EC) el **87,1 %** de los niños tienen un **CD entre 85-120 puntos**

A LOS 28 MESES EL COCIENTE DE DESARROLLO MEDIO ES **94,65 PUNTOS**

Resultados

TEST WISC –IV. PRUEBA DE WECHLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN 6 AÑOS

Tabla . Cociente de Inteligencia Total a los 6 años . Test de WISC-IV		
	CI Total n= 25	%
<70	1	4
71-84	3	12
85-120	22	84
>120	0	
Media ± SD	94,3± SD 2,54	

A los 6 años el **84 %** de los niños obtuvieron CI entre **85-120**

A LOS 6 AÑOS LA MEDIA DE COCIENTE DE INTELIGENCIA ES **94,3 PUNTOS**

Resultados

CASOS DE SOSPECHA DE TEA SEGÚN MÉTODO DE CRIBADO

Tabla 6. Alteraciones en el perfil de conducta durante el seguimiento hasta los 6 años

	n	Casos positivos	%
Riesgo de TEA			
Diagnóstico por M-CHAT 18 meses $\geq$ 3 fallos	20	8	40
Diagnóstico por M-CHAT 18 meses $\geq$ 5 fallos	20	1	5
Diagnóstico por SCQ 6 años $\geq$ 15 puntos	15	1	6,67
Síntomas clínicos de sospecha de TEA 6 años	25	3	12
Diagnóstico de TEA 6 años	25	1	4
Diagnóstico de TEA y TDAH			
Diagnóstico de TEA + TDAH	25	1	4

Resultados

CASOS SOSPECHA TDAH SEGÚN MÉTODO DE CRIBADO

Tabla . Alteraciones en el perfil de conducta durante el seguimiento hasta los 6 años

	n	Casos positivos	%
Riesgo de TDAH			
Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners de padres (Hiperactividad)	15	8	53,33
Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners de colegio (Rendimiento)	21	8	38,10
Diagnóstico de sospecha – Escala de Conners de colegio (Inatención-Inquietud)	22	4	18,18
Diagnóstico TDAH – Escala de Conners de padres + colegio	14	2	14,29
Diagnóstico de TEA y TDAH			
Diagnóstico de TEA + TDAH	25	1	4

Resultados

UTILIZACION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE 0-2 AÑOS

Tabla: Utilización de recursos educativos

		Total (n)	%
0-2 AÑOS	<i>Atención temprana</i>	27 (45)	60
	<i>Escuela infantil/Guardería</i>	25 (45)	55
	<i>Psicología</i>	27 (45)	60
	<i>Fisioterapia</i>	27 (45)	60

Resultados

UTILIZACION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE 2-6 AÑOS

Tabla 7. Utilización de recursos educativos

		Total (n=45)	%
4-6 AÑOS	Aula ordinaria	45	100
	Aula específica	0	0
	Centro específico	0	0
	PT ^a	8	17,7
	AL ^b	13	28,8
	Educador	0	
	Fisioterapia	2	4,4

^a Maestro de pedagogía terapéutica

^b Maestro de audición y lenguaje

Resultados

SECUELAS DETECTADAS A LOS 7 AÑOS

Tabla 5. Secuelas psicológicas, motoras y neurosensoriales detectadas durante el seguimiento a 4-6 años n (%)

Alteración auditiva (n 45) Hipoacusia de transmisión Hipoacusia neurosensorial	1 (2,22) 0
Alteración visual (n 45) Alteración de agudeza visual leve Uso de lentes Alteración de agudeza visual moderada Alteración de agudeza visual grave	10 (22,22) 9 (20) 0 (0) 0 (0)
PCI nivel 3 (GMFCS) nivel 3A (BFMF) (n 45)	1 (2,2)
Coficiente de Inteligencia 70-84 (n 25) Coficiente de Inteligencia 55-69 (n 25)	3 (12) 1 (4)
TEA (n 25) TDAH (n 14)	1 (4) 2 (14)

- ✓ EL **74 %** de los RNPT no presentó ningún tipo de secuela
- ✓ La mayoría de las secuelas fueron **leves** (24%). No hubo ninguna secuela grave
- ✓ Los problemas **oftalmológicos leves** (alteraciones visuales corregidas con lentes) fueron las secuelas más frecuentes

Gravedad de las secuelas:

Leve	11 (24%)
Moderada	1 (2%)
Grave	0 (0%)

Resultados

RENDIMIENTO

Rendimiento Escolar (n=41)		
	Total (n)	%
Alto	4	10
Medio	25	61
Bajo	11	27
Repite curso	1	2

SE CONSIGUIÓ UN RENDIMIENTO ESCOLAR ADECUADO EN EL 71%

Resultados

Analizamos la relación entre variables relevantes de morbilidad perinatal: **peso <1000g, Pequeño EG, Varón, EG <28 semanas, E. Membrana Hialina, Ductus, Sepsis, Enterocolitis, Hemorragia cerebral, Displasia Broncopulmonar**

DESARROLLO COGNITIVO DEFICIENTE (CI <85)

RENDIMIENTO BAJO

PROBLEMAS ADAPTATIVOS (TDAH y TEA)

Resultados

Relación entre morbilidad perinatal y alteración del Cociente de Inteligencia a los 6 años (CI <85)

Resultados estadísticamente significativos (ES) para <1000 g y varones

Tabla 9. Relación entre morbilidad perinatal y CI total a los 6 años <85 (n = 4)		
	N (%)	
< 1000g	3 (75%)	p = 0,01 OR: 6,6 (IC 95%: 1,6-34,94)
< 28 semanas gestación	1 (25%)	NS
Varones	3 (75%)	p = 0,01 OR: 5,50 (IC 95%: 1,6-40,02)
PEG	1 (25%)	NS
EMH g 3-4	1 (25%)	NS
DAP	1 (25%)	NS
Sepsis	0	NS
Displasia broncopulmonar	1 (25%)	NS
HPIV grado>1	1 (25%)	NS
NS = No estadísticamente significativo		

Resultados

Relación entre morbilidad perinatal y
Rendimiento escolar deficiente (bajo o repite curso)

Resultados estadísticamente
significativos (ES) para **<1000 g**
y **varones**

Tabla 10. Relación entre morbilidad perinatal y rendimiento escolar deficiente (n = 12)

	N (%)	
< 1000g	6 (50%)	p = 0,01 OR: 8,66 (IC 95%: 1,67-44,94)
< 28 semanas gestación	3 (25%)	NS
Varones	10 (83,33%)	p = 0,009 OR: 9,50 (IC 95%: 1,73-52,02)
PEG	3 (25%)	NS
EMH Grado III-IV	2 (16,67%)	NS
DAP	1 (8,33%)	NS
Sepsis	3 (25%)	NS
Displasia broncopulmonar	2 (16,67%)	NS
HPI grado>1	1 (8,3%)	NS
NS = No estadísticamente significativo		

Resultados

Relación entre morbilidad perinatal y
problemas adaptativos (TDAH/TEA)

**Resultados no estadísticamente
significativos (ES)**

Conclusiones (I)

- ✓ **Los patrones de crecimiento fueron mejores a los referidos en la literatura**
- ✓ **La morbilidad más frecuente fue la respiratoria: asma**
- ✓ **El Cociente de Inteligencia a los 6 años se situó en el promedio adecuado a la edad (CI: $94,3 \pm 2,5$ puntos)**

Conclusiones (II)

- ✓ La incidencia de **Parálisis Cerebral** fue inferior a la referida en la literatura
- ✓ La incidencia de patrones de conducta alterados y ajuste social (**TEA y TDAH**) fue superior a la población general, similar a otras publicaciones
- ✓ La mayoría de los niños (**73%**) no presentaron secuelas. Las secuelas más frecuentes fueron leves y de tipo **oftalmológico**

Conclusiones (III)

- ✓ Recibieron **Atención Temprana y Fisioterapia** el 60% de los niños estudiados
- ✓ Se observó una mayor probabilidad de **CI<85 y rendimiento escolar bajo** en los varones menores de 1000 g
- ✓ Un **71 %** de los niños presentaron un **rendimiento escolar adecuado**

Conclusiones (IV)

- ✓ Importancia de un **seguimiento programado y estructurado**, así como un **manejo multidisciplinar con especial hincapié en la Atención Temprana** que permita que nuestros Prematuros alcancen su **máximo potencial**

“Nuestra meta es conseguir que los recién nacidos prematuros alcancen la mayor supervivencia con la menor morbilidad y el mejor ajuste en su entorno familiar y social”

Bibliografía

Couceiro Rosillo S, Palazón Azorín I, Van der Hofstadt Román CS, Rodríguez Marín J. Perfil de desarrollo de una cohorte de muy bajo peso al nacimiento. Acta Pediatr Esp.2014;72:188-93

Rosenbaum PL, Palisano RJ, Bartlett, Galuppi BE, Russel DJ. Development of the Gross Motor Function Classification System for cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology.2008;50:249-53

García P, San Feliciano L, Benito F, García R, Guzmán J, Salas S et al. Evolución a los 2 años de edad corregida de una cohorte de recién nacidos con peso inferior o igual a 1500g de los hospitales pertenecientes a la red neonatal SEN1500. An Pediatr (Barc). 2013;79:279-87

Mercier CH, Dunn M, Ferrelli K et al. The Vermont Oxford Network ELBW Infant follow-up Study group. Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants from the Vermont Oxford Network: 1998-2003. Neonatology.2010;97:329-38

García-Muñoz Rodrigo F, Díez Recinos AL, Garcia- Alix Pérez A, Figueras Aloy J, Vento Torres M et al. Changes in Perinatal Care and Outcomes in Newborns at the Limit of Viability in Spain: The EPI-SEN Study. Neonatology. 2015;107:120-129

El Recién nacido prematuro y sus morbilidades: el seguimiento del neurodesarrollo desde la prevención

Miriam Gonzalez Santacruz

Eva María García Cantó

Cen_neonatos@gva.es

Unidad de Neonatología

Hospital General Universitario de Alicante