“Hemangiomas más allá de la piel”

AUTOR: ÁNGEL MAZARRO LÓPEZ DE LOS MOZOS- RI

TUTORA: M^a CARMEN VICENT CASTELLÓ// AMELIA HERRERO GALIANA

SECCIÓN DE LACTANTES. SERVICIO DE PEDIATRÍA HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DR.
BALMIS, ALICANTE

ÍNDICE

1. CASO CLÍNICO
2. HEMANGIOMAS INFANTILES (HI)
 - I. Concepto
 - II. Epidemiología
 - III. Patogenia
3. PASO A PLANTA
4. HEMANGIOMAS SUBGLÓTICOS
 - I. Clínica
 - II. Diagnóstico diferencial
 - III. Diagnóstico
- IV. Tratamiento
5. PROPRANOLOL
 1. Mecanismo de acción
 2. Efectos adversos
 3. Inicio y seguimiento
6. RESOLUCIÓN DEL CASO
7. CONCLUSIONES

I. CASO CLÍNICO

Acude a UPED...

RNT (41+2 SG); AEG 3720G (p78); No factores de riesgo infeccioso; Parto eutócico; Lactancia materna exclusiva

Lactante de 1 mes con **estridor** y **tiraje** de 6 días de evolución.

Exploración física:

- Hemangioma occipital izquierdo
- Hemangioma 4º dedo mano izquierdo
- Estridor inspiratorio leve que empeora en decúbito supino
 - Tiraje subcostal, intercostal y supraclavicular

Constantes: T° 36´9°C; SatO2 100%; FC 150 lpm.

ORL → **Laringomalacia leve tipo I**

2. HEMANGIOMAS INFANTILES

I. CONCEPTO

- Lesiones vasculares → **Tumores vasculares benignos**
- Cabeza y cuello
- Cualquier parte del organismo.
- Lesiones cutáneas aisladas
- Síndromes o malformaciones
- En el 1-2% de los pacientes con HI cutáneos existen lesiones asociadas en la vía aérea

HEMANGIOMA

MALFORMACIÓN
VASCULAR

II. EPIDEMIOLOGÍA

- Son los tumores más frecuentes de la infancia
- Incidencia: 4-10% de los lactantes < 12 meses
- Sexo femenino
- Raza caucásica
- Asociaciones
 - Gestaciones múltiples
 - Edad materna más avanzada
 - Anomalías placentarias

¡OJO!

- **PREMATUROS**
- **BAJO PESO AL NACER**

III. PATOGENIA

Nacimiento

1 año

5-10 años

FASE PROLIFERATIVA

FASE INVOLUTIVA

3. PASO A PLANTA

Una semana después vuelve a UPED...

Motivo: Acude por **empeoramiento de estridor y trabajo respiratorio**

Afebril; No síntomas catarrales; No rechazo de las tomas

Constantes: Peso 4820g; **FC 176 lpm; FR 60 rpm; SatO2 90%.**

Exploración física:

- Cianosis perioral
- Palidez cutánea
- Estridor bifásico
- Tiraje aún más marcado

- **Hemograma:** Leu 12400/ul(Ne 16´7%, Li 72´3%); Hb 13´6 g/dl; Plaquetas 605000/ul.
- **Bioquímica:** Iones, función hepática y renal normal; No reactantes de fase aguda
- **Coagulación:** Normal

Adrenalina NEB 0´5 ml/kg x 2

Mejoría clínica; SatO2 93-94%

ORL

Fibroscopio flexible: Inflamación subglótica con espacio suficiente

Ingresa en **Lactantes** por sospecha de laringomalacia para estudio y control...

ORL Fibroscopio flexible: **Leve engrosamiento subglótico de aspecto rojo-vinoso**

Sospecha diagnóstica **Hemangioma Subglótico**

3 HEMANGIOMAS SUBGLÓTICOS

- Raro → 1'5% de todas las anomalías laríngeas congénitas
- Aislados
- Asociados a hemangiomas cutáneos
 - Cérvico-facial
 - Mandibular
 - Segmentaria en el área de la barba

I. CLÍNICA

- Fase Proliferativa → 6-12 semanas
- Heterogénea
 - Asintomático
 - Tos perruna
 - Disfonía
 - Ronquidos
 - Hemoptisis
 - Mala alimentación
 - Cianosis
 - Dificultad respiratoria
- Exacerbaciones: Decúbito supino, llanto, infecciones vía respiratoria superior...

ESTRIDOR BIFÁSICO

ALTA MORTALIDAD

50%

OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA

II. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Anomalías laríngeas congénitas

Primeros meses de vida

Estridor crónico

No otra sintomatología

Laringomalacia (60-75%)	Membranas laríngeas (8'6%)	Estenosis subglótica (6'9%)	Parálisis de cuerdas vocales (4'6%)	Quistes (1'7%)	Hendiduras laríngeas (<1%)
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------

III. DIAGNÓSTICO

- Historia clínica // Exploración física
- Pruebas complementarias
 - **Laringoscopia flexible**
 - **Laringoscopia rígida bajo anestesia general:**
 - Pilar diagnóstico
 - Masa lisa rojiza, esponjosa y comprimible
 - Localización: Subglotis posterolateral izquierda
 - **Radiografía simple de cuello:** estrechamiento subglótico asimétrico
 - **TC con contraste:**
 - Ubicación, extensión y gravedad de la obstrucción
 - Excluir otras anomalías
 - **RM de cuello y el cerebro:** Hemangiomas a otros niveles y malformaciones asociadas

IV. TRATAMIENTO

1° PROPRANOLOL: Tratamiento de primera línea de los HI complicados/alto riesgo.

2° Corticoides sistémicos

- Tratamiento de primera línea durante más de 30 años
- Contraindicaciones o una respuesta inadecuada al propranolol
- Efectos adversos con el uso prolongado y mejoría parcial
- Prednisona o prednisolona (2-3 mg/kg/día)

3° Cirugía

- Ablación con láser o escisión quirúrgica
- Casos resistentes

5. PROPRANOLOL

- Antagonista no selectivo de los receptores adrenérgicos β_1 y β_2
- El efecto terapéutico sobre HI se descubrió incidentalmente en 2008
- Ensayos clínicos: Beneficios terapéuticos estadísticamente significativos sin un aumento significativo del riesgo de eventos adversos

I. MECANISMOS DE ACCIÓN

- Vasoconstricción
- Inhibición de la angiogénesis: Suprimiendo tanto VEGF como VEGFR-2.
- Inducción de la apoptosis
- Inhibición de la producción de óxido nítrico
- Regulación del sistema renina-angiotensina

2. EFECTOS ADVERSOS

HIPO TENSIÓN

BRADICARDIA

HIPOGLUCEMIA

HIPERPOTASEMIA

BRONCOESPASMO

DIARREA

EXTREMIDADES
FRÍAS

ESTREÑIMIENTO

ACROCIANOSIS

SUEÑO
INQUIETO

3. INICIO Y SEGUIMIENTO

HISTORIA CLÍNICA

EXPLORACIÓN FÍSICA → FC TA

ECG

- FC por debajo de lo normal para su edad
- Historia familiar de cardiopatía congénita o arritmias
- Historia materna de conectivopatía
- Antecedente personal de arritmia o si esta se detecta durante la exploración

ECOCARDIOGRAMA / RM → Malformaciones

1° Contraindicaciones :

- Alteraciones cardiovasculares: Insuficiencia cardiaca, shock cardiogénico, bradicardia, bloqueos cardiacos de 2° o 3° grado, hipotensión
- Antecedentes de episodios de broncoespasmo o asma
- Hipersensibilidad a Propranolol
- Prematuros con edad corregida < 5 semanas

Considerar otros
tratamientos

2° ¿Tratamiento ambulatorio o intrahospitalario?

- Lactantes < 5 semanas
- Prematuros con edad corregida >5 semanas
- Entorno familiar/social inadecuado
- Hemangioma que afecte al sistema respiratorio o cardiaco
- Riesgo de hipoglucemia

Ingreso hospitalario

5. RESOLUCIÓN DEL CASO

2º día en Lactantes

→ Episodios de **SatO2 65%**

→ UCIP

UCIP

- Precisa **IOT**

- Se realiza laringoscopia en quirófano

→ Masa subglótica que obstruye más de la mitad de la luz laríngea

- Se inicia Metilprednisolona 1 mg/kg/día + **Propranolol 1 mg/kg/día en 3 dosis**

- Episodios de **bradicardia y broncoespasmo**

→ Impiden el ascenso de dosis de propranolol

Una semana con Propranolol

- **Mejoría clínica**
- Extubación
- Laringoscopia → Disminución del tamaño

Dos semanas con Propranolol

- Vuelve a planta de Lactantes
- Dosis Objetivo: Propranolol 2 mg/kg/día
- **Evolución favorable**

↓
ALTA

6. CONCLUSIONES

- Los hemangiomas son **los tumores más frecuentes de la infancia** y aunque lo más frecuente es que aparezcan en la piel, pueden aparecer en cualquier parte del organismo
- Ante un lactante con clínica de estridor de semanas evolución en los primeros meses de vida debemos pensar que podría tratarse de **anomalías a nivel de las vías respiratorias superiores**
- Los hemangiomas a nivel subglótico presentan una **elevada mortalidad** por lo que el diagnóstico y tratamiento inmediato son fundamentales
- El tratamiento de elección para los hemangiomas de alto riesgo o complicados es **el Propranolol**, aunque todavía es necesaria el desarrollo de nuevos estudios

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Kunimoto K, Yamamoto Y, Jinnin M. ISSVA Classification of Vascular Anomalies and Molecular Biology. *Mol Sci*. 2022; 23(4): 2358.
1. Metry DW. Infantile hemangiomas: Epidemiology, pathogenesis, clinical features, and complications. [Internet]. UpToDate; 2022 [acceso Sep 2022]; Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/infantile-hemangiomas-epidemiology-pathogenesis-clinical-features-and-complications?search=hemanfioma%20epidemiologia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
2. Wu L, Wu X, Xu X, Chen Z. Propranolol treatment of subglottic hemangiomas: a review of the literature. *Int J Clin Exp Med*. 2015; 8(11): 19886–19890.
3. Kumar P, Kaushal D, Garg PK, Gupta N, Goyal JP. Subglottic hemangioma masquerading as croup and treated successfully with oral propranolol. *Lung India*. 2019; 36(3): 233–235.
4. Peñarrocha Terés J, Hernández-Gancedo C. Malformaciones congénitas de la vía aérea superior. *Pediatr Integral*. 2013; XVII(5): 351-359.
5. Baselga Torres E, Bernabéu Wittel J, van Esso Arbolave DL, Febrer Bosch MI, Carrasco A, Sanz, de Lucas Laguna R, et al. Consenso español sobre el hemangioma infantil. *An Pediatr (Barc)*. 2016; 85:256-65.

HEMANGIOMAS MÁS ALLÁ DE LA PIEL

AUTOR: ÁNGEL MAZARRO LÓPEZ DE LOS MOZOS- RI

Correo-e: angel.lotimazarro@gmail.com