


Fracturas, la infancia contraataca




Rotatorio Pediatría Ana Climent Inglés
Tutor: Marco Gómez de la Fuente (UPED)

Anamnesis y exploración física

- Niña de 10 años
- Refiere caída sobre el hombro y dolor en éste
- No antecedentes médicos ni quirúrgicos

- Exploración hombro:
 - Dolor a la palpación
 - Ausencia deformidad
 - Crepitación y signo de la tecla en tercio medio

Pruebas diagnósticas



Radiografía de hombro

Tratamiento



vendaje en ocho para clavícula.

Evolución

Se cita para control 3 semanas 02/10/25
Control de evolución por AP
Mantendrá vendaje durante 6 semanas

Revisión literatura

Fractura de clavícula	10-15% ⁽¹⁾
Fractura tercio medio	90% ⁽¹⁾

Indicaciones tratamiento conservador:

- Menos de 1'5 cm de acortamiento
- Contacto entre piezas
- Fractura cerrada
- No compromiso neurovascular

(2) (3)

Revisión literaria

Complicaciones frecuentes:

- Daño neurovascular
- Compresión traqueo-esofágica
- No unión
- Callo vicioso
- Dolor

(2) (3)

Bibliografía

1.- Karzon A, Nazzal E, Cooke H, Keo H, Okonma O, Worden J. Upper Extremity Fractures in the Emergency Department: A Database Analysis of National Trends in the United States. *Hand (NY)*. 2024; 20(6):861–870

2.-Soto-Taborda T, Herrera-Rodríguez AA, García-Carranza MA. Fractura de clavícula: abordaje inicial y generalidades del tratamiento. *Rev Hisp Cienc Salud*. 2020;6(4):193–198.

3.- Rüter H, Radebold T, Lehmann W, Spering C. Treatment of clavicle fractures in children and adolescents : Conservative and surgical treatment options with a focus on the figure-of-eight style brace and intrafocal intramedullary nail osteosynthesis. *Oper Orthop Traumatol*. 2025; 37(3-4):276-289.

